

TABEL 3:

INITIELE CONDITIE	BESCHRIJVING VAN INITIELE CONDITIE
1. Leeftijd	Geboortedatum patiënt
2. Geslacht	Man / Vrouw
3. Type atriumfibrilleren	Eerste episode van atriumfibrilleren Paroxismaal atriumfibrilleren (≤ 7 dagen) Persisterend atriumfibrilleren (> 7 dagen) Langdurig persisterend atriumfibrilleren (≥ 1 jaar) Permanent atriumfibrilleren
4. Co-morbiditeit	Hypertensie Coronairlijden Hartfalen Perifeer vaatlijden Cerebrovasculaire ziekte / CVA Diabetes Mellitus Chronische longziekten Schildklierlijden Obesitas (BMI ≥ 30) Kleplijden OSAS
5. CHA ₂ DS ₂ -VASc score	C (Hartfalen/LV dysfunctie) H (Hypertensie) A ₂ (Leeftijd ≥ 75 jaar) D (Diabetes Mellitus) S ₂ (CVA/TIA/trombo-embolie) V (Vasculaire ziekte) A (Leeftijd 65-74 jaar) S (Geslacht vrouw)
6. Bloedingsrisico HASBLED	H (Hypertensie) A (Abnormale lever- en/of nierfunctie) S (CVA) B (Bloeding) L (Labiel INR) E (Ouder dan 65 jaar) D (Drugs of alcohol)

TABEL 3: Overzicht van initiële condities (incl. beschrijving) in het atriumfibrilleren netwerk